

ANFOTERICINA B COMPLEJO LIPIDICO *Abelcet® Viales de 50 mg/10 mL y 100 mg/ 20 mL*

DOSIS

5 mg/kg/24 horas, i.v. en 2 h

INDICACIONES

Infeción fúngica sistémica resistente a AnfoB convencional o en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

MONITORIZACIÓN

Diuresis, hemograma, iones, BUN, Cr y transaminasas.

No niveles de rutina.

EFECTOS SECUNDARIOS

Anemia y trombopenia

HipoK

Náuseas, vómitos

Fiebre, escalofríos

FARMACOLOGÍA

Abelcet® AnfoB + 2 fosfolípidos (ratio 1:1). Unión a esteroles de la membrana alterando la permeabilidad.

Se acumula en hígado y bazo. **Menos nefrotóxica.**

Vida media (adultos): 24-38 h.

PREPARACIÓN

Viales de 5 mg/mL. Agitar bien el vial hasta que no quede sedimento amarillo en el fondo. Extraer la dosis y diluir en SG5% hasta 1-2 mg/mL. Mezclar bien.

Estable 6 h a Tª ambiente, 48h refrigerado. **No**

congelar. Proteger de la luz.

Compatible:SG5% con dilución 1-2mg/dL.SG10% y

SG15% con dilución 1mg/dL

INCOMPATIBILIDADES

SSF (¡precipita!)

Solución de farmacia

(Gluc/aminoác)