

## **ANFOTERICINA B LIPOSOMAL** *AmBisome® Vial 50 mg/15 mL*

### **DOSIS**

5-7 mg/kg/24h, i.v. en 2 h.

### **INDICACIONES**

Infección fúngica sistémica resistente a AnfoB convencional o en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

### **MONITORIZACIÓN**

Diuresis, hemograma, iones, BUN, Cr y enzimas hepáticas

No niveles de rutina.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Anemia y trombopenia

HipoK

Náuseas, vómitos

Fiebre, escalofríos

### **FARMACOLOGÍA**

AnfoB intercalada entro de un sistema de liberación liposomal.

Unión a esteroles de membrana alterando la permeabilidad.

Se acumula en hígado y bazo.. **Menos nefrotóxica** que la AnfoB convencional. Penetra menos en SNC.

Vida media (adultos): 24-38 h.

### **PREPARACIÓN**

Añadir 12 mL de agua bidestilada → 4 mg/mL.

Mezclar bien durante 30 seg. Estable 24 h refrigerada.

Antes de la administración diluir con SG5% para concentración de 2 mg/mL. Una dilución de 1mg/mL puede hacerse filtrando 1 mL de la solución reconstituida + 3 mL de SG5% (un filtro de 5 micras por cada vial) y usar rápido.

**No congelar. Proteger de la luz.**

Compatible con SG5%

### **INCOMPATIBILIDADES**

**SSF** (¡precipita!)      Solución de farmacia  
(Gluc/aminoác)