

ATROPINA *Ampolla 1 mg/mL*

DOSIS

i.v./i.m.: 0.01-0.03 mg/kg/dosis (i.v. durante 1 min). Se puede repetir cada 10-15 min (máximo 0.04 mg/kg)

e.t.: 0.01-0.03 mg/kg/dosis seguido por 1 mL de SSF.

v.o.: 0.02 mg/kg/4-6 h. Se puede ↑ hasta 0.09 mg/kg/dosis.

INDICACIONES

Bradycardia sinusal sobre todo si hay acción parasimpática sobre el corazón (digoxina, betabloqueantes).

↓ efectos muscarínicos de neostigmina cuando se revierte el bloqueo neuromuscular.

MONITORIZACIÓN

FC

EFFECTOS SECUNDARIOS

Arritmias (en los 2 primeros min de infusión i.v.)

Fiebre, distensión abdominal con ↓ actividad intestinal, RGE.

Midriasis, cicloplejia.

FARMACOLOGÍA

Anticolinérgico (↓ efecto parasimpático y ↑ simpático).

Taquicardia: pico a los 12-16 min tras dosis.

Relaja músculo liso bronquial, ↓ actividad gástrica e intestinal, ↓ tono esfínter esofágico, inhibe secreción salivar.

Duración de la acción: 6 h.

Excreción renal sin modificar.

PREPARACIÓN

Ampollas 1 mg/mL. Diluir 1 mL + 9 mL de SSF.

Dosis: **0.1 mL x kg** (mínimo: 1 mL). Estable 28 días refrigerado.

Compatible con SG5% , SG10% , SSF, solución de farmacia (Gluc/aminoác.)

INCOMPATIBILIDADES

Fenitoína

Trimetoprim-sulfametoxazol