

**CAPTOPRIL** *Capoten® Comprimidos de 12.5, 25 y 50 mg*

**DOSIS**

0,01-0,05 mg/kg/dosis/8-12 h, v.o. 1 h antes del alimento.

Ajustar dosis e intervalo según respuesta.

**INDICACIONES**

Hipertensión arterial moderada-severa.

Reducción de la postcarga en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva.

**MONITORIZACIÓN**

Vigilar TA, función renal y K.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Neonatos son más sensibles que niños mayores.

↓ flujo sanguíneo renal y cerebral en RNPT con hipertensión crónica que han recibido dosis más altas que las recomendadas.

Convulsiones, apnea, letargia, oliguria.

HiperK si suplementos de potasio o diurético ahorrador de K.

**Contraindicado en enfermedad renovascular bilateral o estenosis de arteria renal en pacientes con riñón único.**

**FARMACOLOGÍA**

Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA):

-Vasodilatador.

-↓ resistencias vasculares sin taquicardia refleja.

-↓ postcarga e inhibición a largo plazo de retención hidrosalina.

Buena biodisponibilidad, el alimento disminuye su absorción.

Inicio de acción: 30-90 min.

Duración: 2-6 h (puede llegar hasta 24 h).

**PREPARACIÓN**

Preparar solución v.o. 0.03 mg/mL. Solución estable 14 días a T° ambiente y 56 días refrigerado.