

FLECAINIDA Apocard® Ampolla 150 mg/15 mL y Comprimido 100 mg

DOSIS

Inicial: 2 mg/kg/dosis/12h v.o. Ajustar según respuesta y niveles séricos hasta máx 4 mg/kg/dosis/12h. Corregir antes hiper/hipoK. Efecto óptimo a los 2-3 días; niveles séricos estables 3-5 días. No aumentar dosis más frecuentemente que 1 vez cada 4 días.

INDICACIONES

Arritmia supraventricular que no responde al tratamiento convencional.

Contraindicado en pacientes con cardiopatía estructural.

MONITORIZACIÓN

ECG continuo (arritmias más frecuentes al inicio).

Niveles séricos al inicio, a los 3-5 días tras cambiar dosis y con cambios en la clínica o en la dieta. Niveles terapéuticos: 200-800 ng/mL.

EFECTOS SECUNDARIOS

Arritmias: bloqueo AV, bradicardia, taquicardia ventricular, torsades de pointes.

Efecto inotropeo negativo.

Visión borrosa, mareo y cefalea en niños.

FARMACOLOGÍA

Antiarrítmico clase Ic: ↓ conducción dosis - dependiente → prolonga PR, QRS y QT.

Pico sérico: 2-3 h tras dosis v.o. Lácteos interfieren con su absorción v.o. .

40% Unión a proteínas en adultos.

Niños < 1 año: vida media 11-12 h.

PREPARACIÓN

Comprimido 100 mg y vial 10 mg/mL.

Suspensión oral: preparar para una concentración final de 5mg/mL. **Proteger de la luz.** Estable 45 días refrigerado o a Tª ambiente en plástico o cristal ámbar.