

SOTALOL *Comprimidos de 80 y 160 mg*

DOSIS

Inicial: 1 mg/kg/dosis/12h v.o. ↑ dosis según necesidad cada 3-5 días hasta que el ritmo sea estable.

Máximo: 4 mg/kg/dosis/12h v.o.

INDICACIONES

Taquiarritmias ventriculares y supraventriculares refractarias.

MONITORIZACIÓN

ECG frecuentes durante inicio del tratamiento.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Efecto pro-arritmico en 10% de pacientes pediátricos: bloqueos sinoatriales, bloqueo AV, torsades de pointes, actividad ectópica ventricular. Ocurren normalmente en los primeros días de tratamiento.

Prolongación QT dosis dependiente, fatiga, disnea e hipotensión.

FARMACOLOGÍA

Antiarrítmico que combina propiedades de clase II y III.

Buena biodisponibilidad v.o., < absorción con alimento (especialmente con leche).

No unión a proteínas, ni metabolismo. Excreción renal sin modificar.

Vida media en niños: 8 h; > en pacientes mayores o con daño renal.

PREPARACIÓN

Comprimidos de 80 y 160 mg. Preparar suspensión v.o. de 5 mg/mL. Estable 60 días refrigerado.