

CASPOFUNGINA *Cancidas® Viales de 50 y 70 mg*

DOSIS

1-2 mg/kg/24h (25 mg/m²/24h), i.v. en 1 h.

INDICACIONES

Candidemia refractaria, abscesos intraabdominales, peritonitis y pleuritis.

Intolerancia a AnfoB.

Aspergilosis invasiva refractaria.

MONITORIZACIÓN

Vigilar lugar de inyección.

K, Ca y transaminasas periódicos.

EFECTOS SECUNDARIOS

Tromboflebitis.

HiperCa e hipok.

↑ Transaminasas.

↑ Bilirrubina directa.

Adultos: fiebre, cefalea, vómitos, diarrea, irritación local en lugar de inyección.

FARMACOLOGÍA

Echinocandins → inhiben síntesis de la membrana fúngica.

Fungicida frente a *Cándida*. Fungostático frente a *Aspergillus*

Excreción 1ª por hígado (metabolismo por O-metiltransferasas).

Dexametasona, fenitoína, carbamazepina, nevirapina y rifampicina inducen aclaramiento de la caspofungina (↓ niveles séricos).

PREPARACIÓN

Se mantiene refrigerado. Antes de administrar llevar a Tª ambiente y añadir 10.5 mL de SSF o agua estéril.

Agitar bien. Estable durante 1 h. No usar si precipita.

Después tomar 10 mL de la solución reconstituida y añadir 250 mL de SSF o Ringer lactato → 0.2 mg/mL.

Estable 24 h a Tª ambiente, 48 h refrigerado.

También se puede diluir en 100mL de diluyente compatible para pacientes con restricción de líquidos.

Compatible con SSF y Ringer lactato.

INCOMPATIBILIDADES

Soluciones con glucosa

No hay datos sobre la co-infusión con otras drogas