

## CEFAZOLINA Viales de 500 mg, 1g y 2g

### DOSIS

25 mg/kg/dosis, i.v. lento o i.m.

EPM	días	Intervalo
≤ 29	0-28	/ 12 h
	> 28	/ 8 h
30-36	0-14	/ 12 h
	> 14	/ 8 h
37-44	0-7	/ 12 h
	>7	/ 8 h
≥ 45	todos	/ 6 h

### INDICACIONES

Profilaxis de infección quirúrgica.

Infección urinaria o de partes blandas por S.aureus penicilin-resistente, Klebsiella y Proteus.

### MONITORIZACIÓN

Vigilar lugar de inyección. No niveles de rutina.

### EFFECTOS SECUNDARIOS

Flebitis.  
Eosinofilia.

### FARMACOLOGÍA

Cefalosporina 1ª generación. Se inactiva por bacterias productoras de betalactamasas. Pobre penetración en SNC.

Excreción renal sin modificar. Vida media: 3-5 h.

### PREPARACIÓN

Mezclar 500 mg con 2 mL de SSF o agua estéril → 225 mg/mL. Estable 24 h a Tª ambiente o 10 días refrigerada. Después añadir 1 mL de la solución reconstituida a 10 mL de agua estéril o SG5% → 20 mg/mL.

Compatible con SG5%, SG10%, SSF, solución de farmacia (Gluc/aminoác) y emulsión lipídica.

### INCOMPATIBILIDADES

Amiodarona                      Cimetidina

Fenobarbital

Vancomicina

No hay datos sobre la compatibilidad con Cloruro potásico.