

ACIDO URSODEOXICOLICO *Ursochol® Cápsulas 150, 250 y 300 mg*

DOSIS

10-15 mg/kg/dosis/12 h, v.o.

INDICACIONES

Tratamiento de la colestasis asociada a NPT, atresia biliar y fibrosis quística.

Disolución de cálculos biliares (tratamiento durante meses)

MONITORIZACIÓN

Control de transaminasas y bilirrubina directa

EFFECTOS SECUNDARIOS

Náuseas y vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia

FARMACOLOGÍA

Ácido biliar hidrofóbico que ↓ secreción hepática de colesterol y su absorción intestinal. Buena absorción v.o. Se conjuga con taurina o glicina entrando así a la circulación enterohepática y se excreta por la bilis al intestino. Se hidroliza de nuevo a la forma no conjugada o se convierte a ácido litocólico para excretarse por las heces.

Vida media adultos: 3-4 días

PREPARACIÓN

Cápsulas de 300 mg. Preparar en farmacia solución v.o. 25mg/ml. Agitar bien. Estable 60 días a T^a ambiente o refrigerado.

INCOMPATIBILIDADES

No administrar conjuntamente con antiácidos con aluminio (inhiben absorción del fármaco)