

## **ESPIRONOLACTONA** *Aldactone® comprimidos 25 y 100 mg*

### **DOSIS**

1-3 mg/kg/dosis/24 h, v.o.

### **INDICACIONES**

Insuficiencia cardiaca congestiva

Broncodisplasia pulmonar

Se usa generalmente asociado a otros diuréticos.

### **MONITORIZACIÓN**

Control estrecho de K (niveles urinarios de K: útil indicador de efectividad) **Cuidado en**

**pacientes con daño renal.**

Puede dar falsos positivos al screening ELISA de hiperplasia suprarrenal congénita

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Rash cutáneo

Vómitos, diarrea

Parestesias, cefalea, somnolencia

Efectos androgénicos en mujeres (dosis dependiente)

Ginecomastia en varones

### **FARMACOLOGÍA**

Antagonista competitivo de mineralocorticoides.

Metabolitos activos de vida media larga. Gran unión a proteínas.

↓ excreción renal de K

↑ excreción de Ca, Mg, Na, Cl

Vida media: 13-24 h

### **PREPARACIÓN**

Comprimidos de 25 y 100 mg. Machacar 8 comp de 25 mg + 50 mL de jarabe → suspensión oral 4 mg/mL. Estable 1 mes refrigerada