

LAMIVUDINA (3TC) *Epivir® solución v.o.50mg/5mL . Zeffix® solución v.o. 25mg/5mL*

DOSIS

2 mg/kg/dosis/12h v.o. durante una semana desde el nacimiento.

INDICACIONES

Prevención de la transmisión vertical de VIH en RN de madres infectadas que no han recibido tratamiento durante el embarazo (sólo han recibido tratamiento intraparto).

Considerar el uso de lamivudina con zidovudina en neonatos que reciben una dosis única de nevirapina (para reducir el riesgo potencial de resistencia a nevirapina).

MONITORIZACIÓN

No necesaria dado el corto periodo de tratamiento.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Bien tolerado habitualmente.

No hay datos en neonatos.

En adultos se ha descrito acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluyendo algún caso de desenlace fatal.

FARMACOLOGÍA

Análogo nucleósido sintético: inhibe la replicación viral por interferir con la transcriptasa inversa.

Excreción renal.

Buena absorción oral (biodisponibilidad 66%). Pobre penetración en SNC.

Vida media en < 33 sem.: 14 h.

Desarrollo rápido de resistencias en monoterapia.

TMP-SMX ↑niveles de lamivudina.

PREPARACIÓN

Solución oral en concentraciones de 5mg/mL y 10mg/mL.

Mantener a T^a ambiente.