

LINEZOLID Zyvoxid® bolsa 2mg/mL, Suspensión 100 mg/5 mL y Comprimido 600 mg

DOSIS

10 mg/kg/dosis/8h (RNPT < 7 días: cada 12h),
i.v. 30-120 min o v.o

INDICACIONES

Uso restringido a infecciones sin afectación meníngea resistentes a otros antibióticos (S.aureus meti-R, S.pneumoniae peni-R, E.faecium vanco-R).

No usar como tratamiento empírico.

MONITORIZACIÓN

Hemograma y transaminasas semanales.

TA si tratamiento conjunto con simpaticomiméticos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ↑ transaminasas y diarrea (6-10%)
- Anemia y trombopenia (1%)
- Rash (1%)

FARMACOLOGÍA

Oxazolidinona → inhibe síntesis proteica bacteriana. Bacteriostático (bactericida frente a S.pneumoniae, B.fragilis y C.perfringens)

Buena penetración en tejido osteoarticular y líquido sinovial.

Absorción v.o. completa y rápida. Metabolismo por oxidación. Excreción renal sin modificar (30%) y como metabolitos inactivos.

Vida media: 2-3 h (RNPT < 7 días: 5-6 h).

PREPARACIÓN

Preparación i.v.: bolsa 300 mL; 2 mg/mL. Mantener en la envoltura de aluminio hasta su uso, a T^a ambiente. No congelar. La solución i.v. puede ser de color amarillo que se intensifica con el paso del tiempo sin afectar su efectividad.

Preparación v.o.: Suspensión 100 mg/5mL. Mantener a T^a ambiente. Usar en 21 días tras reconstitución.

Proteger de la luz.

Compatible con SG5%, SSF, Ringer lactato y solución de farmacia (Gluc/aminoác.).

INCOMPATIBILIDADES

Anfotericina B Diazepam Eritromicina
lactobionato
Fenitoína