

METRONIDAZOL Flagyl® Solución i.v. 5 mg/mL y suspensión v.o. 200 mg/5 mL

DOSIS

Carga: 15 mg/kg

Mantenimiento: 7.5 mg/kg

Ambas: v.o. o i.v. en 60 min

EPM	días	Intervalo
≤ 29	0-28 > 28	/ 48 h / 24 h
30-36	0-14 > 14	/ 24 h / 12 h
37-44	0-7 >7	/ 24 h / 12 h
≥ 45	todos	/ 8 h

INDICACIONES

Uso restringido a meningitis, ventriculitis y endocarditis por *B.fragilis* y otros anaerobios resistentes a penicilina.

Infección grave intraabdominal.

Infección por *Trichomonas vaginalis*.

Colitis por *C.difficile*.

MONITORIZACIÓN

Medir niveles al tratar infecciones de SNC (valle debe ser > a la CMI).

EFFECTOS SECUNDARIOS

Crisis convulsivas y polineuropatía sensitiva (tratamiento prolongado en adultos).

Coloración marrón de la orina.

Carcinogénico en ratas.

FARMACOLOGÍA

Bactericida. Buena absorción v.o. Pico sérico: 1-3 h.

Gran distribución en todos los tejidos.

< 20% unión a proteínas.

Hidroxilación hepática en RNT y RNPT expuestos a betametasona prenatal. Excreción renal sin modificar y metabolitos activos.

Vida media para la eliminación: 22-109 h

(dependiente de EG).

PREPARACIÓN

Preparación i.v.: Envase preparado para usar de 100 y 300 mL; 5 mg/mL. (14 mEq Na por envase).

Mantener a T^a ambiente. **No refrigerar.**

Preparación v.o.: Suspensión v.o. 200 mg (125mg base)/5 mL y comprimidos de 250 mg.

Compatible con SG5% y SSF.

INCOMPATIBILIDADES

No mezclar con ningún otro fármaco ni suero; si se administra en "Y" suspender la infusión mientras se administra el metronidazol.

Aztreonam

Meropenem