

CLORURO POTASICO *Ampolla 2 mEq/mL (Cl K 2 M) ó 1 mEq/mL (Cl K 1 M)*

DOSIS

Reposición v.o.: 0.5-1 mEq/kg/día, dividido en varias dosis y **con alimento**.

(1g ClK = 13.4 mEq K ; 1 mEq K = 74.6 mg ClK)

HipoK sintomática: 0.5-1 mEq/kg i.v. en 1 h.

Concentración máx por vía periférica 40 mEq/L; vía central 80 mEq/L

MONITORIZACIÓN

Vía i.v.: Monitor continuo ECG (especialmente por vía central)

Vigilar lugar de inyección

EFFECTOS SECUNDARIOS

Arritmias (sobre todo i.v. central e infusiones rápidas)

Tromboflebitis y dolor en punto de inyección

Intolerancia digestiva (diarrea, vómitos y sangrado)

FARMACOLOGÍA

Principal catión intracelular

Absorción completa v.o.

Síntomas de hipoK: debilidad muscular, parálisis, ileo, retención urinaria y cambio en el EKG (↓ST, onda T de escaso voltaje, aparición de onda U)

PREPARACIÓN

Ampollas 2 mEq/mL (Cl K 2 M) ó 1 mEq/mL (Cl K 1 M).

Siempre diluir antes de la administración.

Osmolaridad 4355 mOsm/kg

Varias soluciones orales: 10-40 mEq/15mL.

Compatible con la mayoría de soluciones i.v.

INCOMPATIBILIDADES

Anfotericina B

Diazepam

Fenitoína