

## **GLUCAGON** *Glucagen Hipokit Nov vial® 1mg + jeringal de 1 mL*

### **DOSIS**

200mcg/Kg /dosis (0.2mg/Kg/dosis) i.v., i.m., o sc.

Dosis máxima: 1mg.

Perfusión continua: 10-20mcg/Kg/h.

La glucosa comienza a aumentar a la hora de iniciar la infusión.

### **INDICACIONES**

Tratamiento de la hipoglucemia refractaria a la infusión de glucosa i.v. o si no se dispone de ésta.

En casos documentados de déficit de glucagón.

### **MONITORIZACIÓN**

Control estrecho de glucemia.

Vigilar hipoglucemia de rebote.

Ascenso en los niveles de glucosa duran aproximadamente 2h.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Náuseas, vómitos

Taquicardia

Ileo

Hiponatremia

Trombocitopenia

### **FARMACOLOGÍA**

Estimula la síntesis de AMP cíclico, especialmente en hígado y tejido adiposo.

Estimula gluconeogénesis.

A dosis altas efecto inotrópico cardíaco.

Inhibe motilidad del intestino delgado y la secreción ácida.

### **PREPARACIÓN**

Vial de 1mg. Disolver el producto liofilizado con su diluyente. Precipita en soluciones con cloruro.

1 unidad equivale a 1mg.

Usar inmediatamente después de reconstituir.

*No hay datos de compatibilidad.*

### **INCOMPATIBILIDADES**

*Soluciones con cloruro*