

**PALIVIZUMAB Synagis® vial de 50mg y 100mg**

**DOSIS**

15mg/Kg /dosis , i.m. en cara lateral del muslo.  
Repetir dosis de forma mensual durante la estación de VRS

**INDICACIONES**

Inmunoprofilaxis de la infección del tracto respiratorio inferior por VRS en pacientes de riesgo:

-prematuros ≤ 35 sem. Que tienen de 6 meses al inicio de la estación.

-<2años con necesidad de tratamiento para DBP en los últimos 6 meses.

- pacientes con cardiopatía congénita hemodinámicamente inestable.

No es eficaz como tratamiento de la infección establecida por VRS.

**MONITORIZACIÓN**

Vigilar el sitio de inyección por induración y edema.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Algunos ensayos refieren discreto aumento en la frecuencia de infección respiratoria de vías altas, otitis media, fiebre y rinitis.

Se han descrito ligeramente más frecuente cianosis y arritmias en pacientes con cardiopatía congénita.

Posible anafilaxia

**FARMACOLOGÍA**

Anticuerpo monoclonal humanizado producido por tecnología de DNA recombinante. Inhibe la replicación del VRS.

Vida media:20días. Se mantiene un adecuado título de anticuerpos durante 1mes (menos en RNPT de muy bajo peso por metabolismo acelerado).

No interfiere con la respuesta a otras vacunas , por lo que éstas se pueden administrar conjuntamente.

**PREPARACIÓN**

Viales de 50mg y 100mg preparados para su administración. No precisa reconstitución.

Administrar lo antes posible una vez cargado.

**No congelar ni sacudir.** Almacenar refrigerado entre 2-8°C.

No contiene conservantes, thiomersal ni otras sales de mercurio.