

## **PIRIDOXINA vial de 1mL y 2mL (1mg/mL)**

### **DOSIS**

**Dosis inicial para diagnóstico:** 50-100mg i.v. en bolo o i.m.

**Dosis de mantenimiento:** 50-100mg / 24h, vía oral. Pueden precisarse altas dosis durante periodos de enfermedad intercurrente.

### **INDICACIONES**

Diagnóstico y tratamiento de crisis dependientes de piridoxina.

### **MONITORIZACIÓN**

Si es posible, monitorización de EEG durante la administración inicial de piridoxina.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Riesgo de sedación profunda. Puede ser necesaria la ventilación mecánica como soporte.

### **FARMACOLOGÍA**

Las crisis dependientes de piridoxina es el resultado de un defecto en la unión de piridoxina para la formación de GABA (neurotransmisor inhibitor).

La administración de dosis farmacológicas de piridoxina puede corregir la deficiencia de GABA.

### **PREPARACIÓN**

Vial inyectable de 1mg/mL de 1 mL y 2mL. Se puede usar el vial para administrar por vía oral. **Proteger de la luz.**

**Compatible con emulsión lipídica.** No hay datos de compatibilidad con solución de farmacia (Gluc/aminoác).

### **INCOMPATIBILIDADES**

**Soluciones alcalinas**

**Sales de hierro y agentes antioxidantes**

**No hay datos con CIK y heparina**