

FLUMAZENILO *Anexate® Ampollas de 0.5 mg/5 mL y 1 mg/10 mL*

DOSIS

i.v.: 5-10 mcg/kg/dosis, en 15 seg. Repetir cada 45 seg hasta despertar. No sobrepasar 50 mcg/kg o 1 mg en lactantes.

Rectal: 15-30 mcg/kg/dosis. Repetir si no efecto en 15-20 min.

Intranasal: 20 mcg/kg/dosis por cada narina.

INDICACIONES

Antídoto frente a sobredosis de benzodiazepinas

MONITORIZACIÓN

Monitorizar EKG y TA

Control del despertar. Vigilar depresión respiratoria

EFFECTOS SECUNDARIOS

Hipotensión (si administración rápida, en adultos)

Dolor y extravasación en lugar de inyección

Resedación 20-50 min después, hasta en el 10% de los niños

Convulsiones: sobre todo si preexistentes o sedación muy prolongada.

FARMACOLOGÍA

Imidazobenzodiazepina inhibe competitivamente el receptor GABA/BZD. Metabolismo hepático.

Muy liposoluble: penetra bien SNC.

Pico de acción i.v. en 3 min.

Vida media: 20-75 min.

PREPARACIÓN

Viales de 5 y 10 mL; 0,1 mg/mL = 100mcg/mL.

Diluir 1 mL + 9 mL de SSF → dosis: 1 mL x Kg i.v. (10mcg/Kg)

Conservar a T^a ambiente, desechar el vial abierto o preparado tras 24 h.

Compatible con SG5%, Ringer lactato y SSF.