

**LEVETIRACETAM** *Keppra® Vial 100 mg/mL, solución v.o. 100 mg/mL y comprimidos 250 y 500 mg*

**DOSIS**

10 mg/Kg/dosis v.o., i.v. en 15 min a concentración 5 mg/mL  
Ajustar dosis según necesidad cada 1-2 sem hasta máx 30 mg/kg/dosis. Retirar lentamente.  
Intervalo: neonatos cada 24 h; Lactantes/niños cada 12 h.

**INDICACIONES**

Anticomitial de 2ª línea (crisis refractarias a fenobarbital y otros)

**MONITORIZACIÓN**

No niveles de rutina  
(terapéuticos: 10-40 mcg/mL)

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Sedación, irritabilidad

**FARMACOLOGÍA**

Absorción v.o. rápida y completa. Inicio de acción en 30 min, pico a las 2 h. Biodisponibilidad no afectada por alimento.

Vida media: 18 h (neonatos); 6 h (> 6 meses).

Excasa unión a proteínas. Excreción renal 66% sin modificar y el resto como metabolitos. Ajustar dosis si daño renal.

**PREPARACIÓN**

-Vial de 5 mL; 100 mg/mL. Diluir 1 mL del vial + 19ml de SSF o SG5% (5mg/mL)→dosis: 2mL x Kg (10mg/kg)

Conservar a Tª ambiente

-Solución v.o.: 100 mg/mL. Conservar a Tª ambiente

**Compatible con SG5%, Ringer lactato y SSF.**