

METADONA *Solución v.o.10 mg/10 mL y Metasedin® ampolla 10 mg/mL*

DOSIS

0.05-0.2 mg/kg/dosis/12-24 h, v.o.
Reducción de dosis: bajar 10-20% semanal en 4-6 semanas según clínica.

INDICACIONES

Tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos

MONITORIZACIÓN

Monitorización cardiorrespiratoria (control bradi-taquicardia)
Vigilar restos gástricos, distensión abdominal, disminución de ruidos intestinales

EFFECTOS SECUNDARIOS

Depresión respiratoria si sobredosis.
Íleo y retraso del vaciamiento digestivo.
Prolongación del QT (excepcional y autolimitado)

FARMACOLOGÍA

Narcótico de larga duración. Biodisponibilidad del 50%.

Pico sérico a las 2-4 h. Metabolismo hepático. 90% Unión a proteínas. Vida media 16-25 h (mayor si daño renal)

Rifampicina y Fenitoína aceleran su metabolismo → riesgo de Síndrome de abstinencia

PREPARACIÓN

Solución v.o.: 10 mg/mL. Diluir 1 mL de la solución 10 mg/mL + 19 mL de agua estéril → 0,5 mg/mL.

Estable refrigerado 24h. **La solución ORAL no debe ser inyectada**