

NEOSTIGMINA Prostigmine® Ampolla 0.5 mg/mL

DOSIS

Miastenia gravis: 0.1 mg i.m. (30 min antes de las comidas) ó 1 mg v.o. (2 h antes). Pueden requerirse dosis mayores.

Reversión de bloqueo muscular:

0.04-0.08 mg/kg i.v. asociado a

ATROPINA 0.02 mg/kg i.v.

INDICACIONES

Miastenia gravis neonatal transitoria

Miastenia gravis congénita

Revierte el bloqueo muscular de ciertos fármacos

MONITORIZACIÓN

Monitorización cardiorrespiratoria

EFFECTOS SECUNDARIOS

Debilidad muscular, temblor, bradicardia,

hipotensión, depresión respiratoria,

broncoespasmo, diarrea, hipersalivación

Contraindicada si hipotensión, bradicardia u obstrucción urinaria/intestinal

Precaución ante pacientes con arritmias y/o broncoespasmo

FARMACOLOGÍA

Inhibe la acción de la acetilcolinesterasa en la unión neuromuscular → acúmulo de acetilcolina.

PREPARACIÓN

Ampolla de 0.5 mg/mL.

Concentración 1:2000 (0,5 mg/mL).

Proteger de la luz.

No hay datos de compatibilidad con soluciones.