

PARACETAMOL solución v.o. 100 mg/mL y 120mg/5 mL

DOSIS

Carga: v.o. 20-25 mg/kg; rectal 30 mg/kg

Mantenimiento: v.o. 12-15 mg/kg/dosis; rectal 12-18 mg/kg/dosis. Intervalo:

RNT: cada 6 h

Edad corregida \geq 32 sem: cada 8h

Edad corregida < 32 sem: cada 12 h

INDICACIONES

Fiebre. Analgesia leve-moderada.

En España no se recomienda i.v. en < de 33 Kg.

MONITORIZACIÓN

Niveles plasmáticos si sospecha de toxicidad

Monitorizar T^a, dolor, función hepática

EFFECTOS SECUNDARIOS

Sólo ante dosis elevadas o > **48 horas de uso terapéutico**

Rash, fiebre, citopenias

Tratamiento ante toxicidad: N-acetilcisteína (a 40 mg/mL): 150 mg/kg en SG5% i.v. en 60 min seguido de 50 mg/kg en 4 h (en SG5%) y finalmente 100 mg/kg en 16 h. Continuar hasta mejoría clínica-analítica y lograr niveles infratóxicos.

FARMACOLOGÍA

Antipirético y analgésico no opioide

Pico sérico v.o.: 60 min. Absorción rectal muy variable y prolongada. Metabolismo hepático y eliminación renal. Riesgo de acúmulo si disfunción hepática. Vida media:

- RNT: 3 horas

- >32 sem: 5 h

- < 32 sem: > 11 h

PREPARACIÓN

Apiretal® gotas y Gelocatil® solución v.o. 100 mg/mL.

Termalgin® solución v.o. 120 mg/5 mL y

supositorios de 150, 325 y 650 mg.

Febrectal® solución v.o. 120 mg/5 mL y supositorios de 150, 300 y 600 mg.