

SURFACTANTE PULMONAR BOVINO *Survanta® Vial 200 mg/8 mL*

DOSIS

4 mL/kg/dosis, en 4 alícuotas. Vía endotraqueal.

Profilaxis: 1ª dosis precoz tras el nacimiento, hasta 3 dosis adicionales en las primeras 48h si precisa.

Tratamiento de rescate del SDR: hasta 4 dosis en las primeras 48h, no más frecuente que cada 6h.

Antes de administrar mantener a Tª ambiente 20 min o calentar en mano al menos 8 min.

No emplear métodos artificiales de calentamiento. Administrar las 4 alícuotas con el paciente en distintas posiciones para mejorar la distribución. **No filtrar ni agitar.**

EFFECTOS SECUNDARIOS

Reflujo hacia arriba por el tubo endotraqueal y ↓ Saturación de O₂.

Hemorragia pulmonar (2-4% de los pacientes tratados), sobre todo cuanto más pequeños y si el DAP no ha sido tratado.

FARMACOLOGÍA

Extracto natural modificado del pulmón bovino que contiene fosfolípidos, lípidos neutrales, ácidos grasos y proteínas B y C asociadas a surfactante, palmitato colfosceril, ácido palmítico y tripalmitin.

Suspensión con SSF. Esterilizado por calor.

Modifica la tensión en la superficie alveolar, estabilizándola.

PREPARACIÓN

Refrigerar (2-8°C) y proteger de la luz.

Comprobar color normal (de blanquecino a marrón claro)

Si se deposita remover bien. **No agitar.**

Cada vial sólo debe usarse una vez, descartar el restante. Los viales no abiertos que se habían calentado pueden refrigerarse durante 24 h para un uso posterior (pero sólo una vez).