

**SURFACTANTE PULMONAR PORCINO** *Curosurf® Vial 120 mg/1.5 mL y 240 mg/3 mL*

**DOSIS**

**Inicial:** 2.5 mL/kg en 2 alícuotas

**Siguientes:** hasta 2 dosis de 1.25 mL/kg/dosis, cada 12 h

Vía endotraqueal

Se puede administrar 2-4 alícuotas con el paciente en distintas posiciones para mejorar la distribución. **No filtrar ni agitar.**

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Reflujo hacia arriba por el tubo endotraqueal y ↓ Saturación de O<sub>2</sub>.

Hemorragia pulmonar (2-4% de los pacientes tratados), sobre todo cuanto más pequeños y si el DAP no ha sido tratado.

**FARMACOLOGÍA**

Extracto modificado derivado del pulmón porcino que contiene fosfolípidos, lípidos neutrales, ácidos grasos y proteínas B y C.

Modifica la tensión en la superficie alveolar, estabilizándola.

**PREPARACIÓN**

**Refrigerar (2-8°C) y proteger de la luz.**

Comprobar color normal (blanco cremoso). Si se deposita girar suavemente el vial de arriba abajo. **No agitar.**

Cada vial sólo debe usarse una vez, descartar el restante. Los viales no abiertos que se habían calentado pueden refrigerarse durante 24h para un uso posterior (pero sólo una vez).